

RAD ANTIRABIČNE STANICE U RAZDOBLJU OD 2003. DO 2018. GODINE


U antirabičnoj stanici Zavoda za javno zdravstvo u periodu od 2003. do 2018. godine pregledano je ukupno 2548 ugruženih osoba od kojih je 650 bilo i cijepljeno. (Tablica 3.).

Tablica 3 Broj pregledanih i cijepljenih osoba u Koprivničko-križevačkoj županiji u periodu od 2003. do 2018. godine

Godina	Broj pregledanih osoba	Broj cijepljenih osoba			% cijepljenih osoba
		cjepivo	cjepivo + Ig	ukupno	
2003.	193	39	1	40	20,7
2004.	138	28	3	31	22,5
2005.	190	35	1	36	18,9
2006.	202	66	4	70	34,7
2007.	137	31	3	34	24,8
2008.	192	35	8	43	22,4
2009.	213	46	8	54	25,4
2010.	143	38	4	42	29,4
2011.	170	36	6	42	24,7
2012.	166	43	4	47	28,3
2013.	156	30	4	34	21,8
2014.	136	40	4	44	32,3
2015.	111	25	1	26	23,4
2016.	162	33	3	36	22,2
2017.	121	30	2	32	26,4
2018.	118	38	1	39	33,0
Ukupno	2548	593	57	650	25,5


Najviše osoba moralo je biti cijepljeno zbog kontakta s nepoznatom, uginulom, odlutalom, ubijenom ili divljom životinjom (skupina C) te zbog kontakta sa utvrđeno bijesnom životinjom (skupina A).

Slika 8 Osobe cijepljene protiv bjesnoće na području Koprivničko-križevačke županije u periodu od 2003. do 2018. godine s obzirom na vrstu životinje s kojom je osoba bila u kontaktu



Iz navedenog vidimo kako je najveći broj osoba, čak 81%, cijepljeno nakon ugriza ili kontakta s psom i mačkom. Najčešće se radi o životinjama nepoznata cijepnog statusa, koje su nakon ugriza odlutale i nisu mogle biti stavljene pod veterinarski nadzor. (Slika 8).

Slika 9 Osobe cijepljene protiv bjesnoće na području Koprivničko-križevačke županije u periodu od 2003. do 2018. godine s obzirom na ozlijeđeni dio tijela



Najviše je osoba koje smo cijepili bilo ugrizi za ruku što je i razumljivo jer se ugriz najčešće dogodi kad osobe same aktivno krenu rukom prema životinji ili se od nje brane.

Darko Radiček, dr.med.spec.epidemiologije